UNA INTERESANTE ADICION A LAS RAPACES DE COLOMBIA

F. C. LEHMANN V.

Leucopternis princeps zimmeri Friedmann

Ejemplar examinado: 1 ♀ adulta, de Landázuri (Depto. de Santander), Col. *Hno. Nicéforo,* julio 1939 (Mus. Inst. La Salle, Bogotá).

Al dar esta denominación al primer ejemplar de esta rarísima águila que ha sido hallado en Colombia, sigo el criterio de H. Friedmann quien, en The Auk, Vol. LII, enero de 1935, distingue dos razas de *Leucopternis princeps* restrigiendo la raza típica a Costa Rica y el occidente de Panamá y dando a los ejemplares del Ecuador un nuevo nombre subespecífico.

El ejemplar que me ocupa pertenece a la colección del Museo del Instituto de La Salle, en Bogotá. Fue obtenido por el Rev. Hermano Nicéforo en Landázuri, (Depto. de Santander), en las cabeceras del río Guayabito, afluente del Carare. El Hno. Nicéforo, muy gentilmente me lo envió para su identificación, y me ha permitido hacer la presente publicación, por lo cual le quedo sinceramente agradecido.

La coloración de este ejemplar se ajusta a la que describe Swann en su obra "Monograph of the Birds of Prey", p. 474. Esta misma coloración tenía un ejemplar, probablemente de esta misma especie, que obtuvo el señor Kjell von Sneidern en el Chocó en 1940, al cual ví muy superficialmente en diciembre de ese mismo año. Lo mismo que el de Santander, el del Chocó era adulto. Es probable que este último fuera *L. princeps princeps* por razones geográficas, pero en cuanto al de Landázuri, no puedo menos que identificarlo con *L. p. zimmeri* por razón de sus dimensiones; en efecto, las alas de este ejemplar tienen 358 mm., la cola 201 mm., el culmen (sin cera) 35 mm., el tarso 90 mm., la longitud total es de 555 mm.

Compárense estas dimensiones con las siguientes, señaladas por Friedmann *(loc. cit.)* al tratar de la forma *zimmeri:*

		Ala	Cola	Culmen (sin cera)
Leucopternis princeps princeps.	♂	364-367	210-223	29,5-31
	♀	380-388	225	32
Leucopternis princeps zimmeri	♂	350-352	191	29-30
	♀	351-358	201	30,5-33

El doctor A. Dugand en su trabajo sobre las Rapaces Colombianas (Rev. Acad. Colomb. Cienc. IV, 16: 401, 403 et 404. 1941) incluyó la especie *princeps* como probablemente existente en Colombia ya que se había señalado tanto en Costa Rica como en el Ecuador. Lo interesante del hallazgo de *L. p. zimmeri* en el nordeste de Colombia, lejos de la Costa del Pacífico (donde con toda probabilidad, como lo indicó el doctor Dugand, debe existir la raza típica *princeps)* es que ambas razas están representadas en Colombia. Próximamente haré una exploración de una parte de la vertiente del Pacífico y espero tener la buena suerte de confirmar allí la presencia de la raza típica.



Leucopternis princeps zimmeri Friedmann

Dibujo: Lehmann